Restitution réseau lait bio
17 – 06 – 11
Haut Corlay

Pôle Herbivores

Résultats économiques 2009/2010

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE
Pôle Herbivores

Moyens de production

Réseau Bretagne	Conventionnel	Biologique
Nombre d'exploitations	40	11
UTH	1,7	2,1
SAU	80 ha	90 ha
Quota	385 098 litres	347 914 litres
Nb VL	57	66
Nb UGB viande	17	0

⇨En bio, davantage de surface et moins de lait à produire

Produit total par UTH



⇨le produit total suit le le quota laitier

⇨en moyenne produit/UTH conventionnel > bio

Pôle Herbivores

L'atelier laitier

Réseau Bretagne	Conventionnel	Biologique
Kg lait par VL	7400	5400
G concentré / kg lait	140	100
Coût alimentaire VL (€/1000 l)	62	64
Dont concentrés	36	29
Dont fourrages	26	35
Frais vétérinaires (€/UGB)	54	25

⇨coût alimentaire bio et conventionnel proche : manque d'autonomie dans certains élevage bios, coût fourrager plus important

Le coût fourrager

Réseau Bretagne	Conventionnel	Biologique
% maïs dans la SFP	30%	7%
Chargement (UGB/ha SFP)	1,6	1,2
Coût SFP (€/ha)	248	185
Coût maïs (€/ha)	509	580
Coût herbe (€/ha)	139	165

⇨coûts herbe et maïs en bio plus élevés qu'en conventionnel , mais part d'herbe plus élevée en bio

Le coût fourrager



⇨coût SFP relié au pourcentage de maïs dans la SFP

Pôle Herbivores

Les frais vétérinaires (€/UGB lait)



⇨forte variabilité sur les frais vétérinaires

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE
Pôle Herbivores

Du produit au revenu disponible (€/1000 litres lait vendus)

Réseau Bretagne	Conventionnel	biologique
Produit total	515	668
Charges opérationnelles	169	150
Frais généraux	120	162
EBE avant MO	226	356

⇨Ecart entre bios et conventionnels se réduit du fait du niveau plus élevé des charges de structure

Du produit au revenu disponible (€/1000 litres lait vendus)

Réseau Bretagne	Conventionnel	Biologique
Dépenses financières	88	79
Main d'œuvre	42	52
Revenu disponible	99	225

⇨En moyenne 38 000 € de revenu disponible en conventionnel – 73 000 € en bio

L'EBE avant main d'œuvre

(€/1000 litres lait vendus)



Meilleure efficacité en bio en lien avec la valorisation du lait

Impact et conséquences de la sécheresse dans les exploitations du réseau lait bio en Bretagne

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE
Pôle Herbivores

Les années se suivent et ne se ressemblent pas

- 2003, 2005, 2006 : sécheresse
- 2007, 2008, 2009 : années favorables aux fourrages
- 2010 : sécheresse
- 2011 : inquiétudes

Sept. 2009– Août 2010 : une année entière d'anomalies

Sept.-Oct.	Très sec et très chaud ➔ pas d'herbe d'automne
Novembre	Pluies importantes (230 mm à Bignan) ➔ sols matraqués
Déc.-Janv.	Froid précoce et persistant
Février	Très favorable
Mars-Avril-Mai	Froid sec et vent desséchant
Fin Mai, début Juin	Pluies orageuses
15 Juin-15 Août	Pas de pluies en dessous d'une ligne Etables - Brest
15 Août – 5 Oct.	Reverdissement sans pousse significative
5 Oct.-26 Nov.	Période très favorable
26 Nov.	La neige !

Conséquences sur les exploitations : la part de pâturage

Le pâturage des vaches laitières : comparaison 2009-2010



- La mise à l'herbe retardée de 10 jours
- La fermeture des stocks retardée de 15 jours
- L'ouverture des stocks avancée de 23 jours

La durée de pâturage plat unique divisée par 2

Les surfaces pâturées par les Vaches Laitières

	2010	2009
Mise à l'herbe	66 ares	59 ares
Printemps	52 ares	49 ares

Une surface mise à disposition plus importante dès la mise à l'herbe

Et aussi en pleine pousse

Les fauches

- 1ère fauche plus tardive (20 mai ← 13 mai)
- Très peu d'enrubannage (2 T ← 20 T)
- Beaucoup moins d'ensilage (55 T ← 76 T)
- … et de foin (83 T ← 104 T)
- Passage de 6 à 4 chantiers
- Dernière fauche le 24 juillet (30 août en 2009)

Les stratégies d'adaptation

- Vente précoce des animaux « improductifs »
- Recherche des solutions locales (herbe sur pied, jachères, ensilage de céréales)
- Bourse aux fourrages
- Utilisation des dérogations mises en place été 2010

Des constats

- Les prairies dégradées produisent peu et résistent mal
- Le surpâturage aggrave la situation
- Le pâturage hivernal : à manier avec précaution
- Les mélanges précoces (RGH – TV) sont utiles

Des réflexions pour l'avenir

- Quels sont les animaux prioritaires pour le maintien du revenu
- Un **bilan fourrager** à une date pertinente
- Développer une veille climatique pour les exploitations bio
- Obtenir une réactivité plus rapide des Pouvoirs Publics

Les travaux en cours sur 2011

- Inventaire des solutions mises en place et pertinence technique et économique
- Quel chargement pour une plus grande autonomie alimentaire
- Quel surface en herbe pour passer 6 mois sans stock